

SKRÓT ARTYKUŁU:

Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży

LENA CICHONŃ/ MAŁGORZATA JANAS-KOZIK/
ANDRZEJ SIWIEC / JANUSZ K. RYBAKOWSKI



Omówienie specyfiki obrazu klinicznego ChAD w dzieciństwie i adolescencji oraz rozróżnienie objawów ChAD od objawów ADHD i borderline.



Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży Lena Cichoń i wsp. →

ŹRÓDŁO:

Cichoń L., Janas-Kozik M., Siwiec A. (2020) Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży. *Psychiatria Polska*, 2020; 54(1): 35–50.

SŁOWA KLUCZOWE:

choroba afektywna dwubiegunowa, zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, leczenie

W SKRÓCIE:

Specyfika obrazu klinicznego ChAD w okresie rozwojowym wiąże się z trudnościami w postawieniu właściwego rozpoznania i odpowiedniego leczenia. W artykule przedstawiono omówienie wyników badań w zakresie epidemiologii, obrazu klinicznego, rozpoznawania i leczenia.

Choroba afektywna

dwubiegunowa (ChAD)

charakteryzuje się patologicznymi zmianami nastroju i aktywności o charakterze epizodów maniakalnych, hipomaniakalnych, depresyjnych lub mieszanych.

DOSTĘP DO RAPORTU

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2020/35Cichon_PsychiatrPol2020v54i1.pdf

Jak odróżnić ChAD od ADHD i Borderline?

schorzenia te mogą współwystępować

ADHD	CHAD	BORDERLINE
<ul style="list-style-type: none"> ● problemy z utrzymaniem uwagi, ● impulsywność ● nadmierna ruchliwość 	Zmiany nastroju i aktywności: epizody manii i depresji.	„osobowość chwiejna emocjonalnie” typ pograniczny <ul style="list-style-type: none"> ● uwikłanie w niestabilne związki, ● lęk przed porzuceniem, ● autoagresja, ● chroniczne uczucie pustki
<p>Cechy wspólne ADHD i CHAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● wzmożona aktywność lub niepokój fizyczny, <ul style="list-style-type: none"> ● wzmożona rozmowność , ● utrata normalnych zahamowań społecznych, <ul style="list-style-type: none"> ● zmiany aktywności lub planów, ● zachowania lekkomyślne 		
	<p>Różnice z ADHD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● gonitwa myśli, ● zmniejszona potrzeba snu, ● zaburzenia rytmu dobowego, ● wzmożona samoocena lub poczucie wyższości, ● wzmożona energia seksualna 	
	<p>Cechy wspólne CHAD i borderline:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● okresy podwyższonego nastroju – manii ● okresy obniżonego nastroju - depresyjne 	
	<p>Różnica z borderline:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● przebieg cykliczny (Borderline jest przewlekłym zaburzeniem o stałych objawach) ● brak lęku przed porzuceniem ● długie okresy dobrego funkcjonowania 	



NARZĘDZIOWNIK